



О ВАЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ЛИЦ С ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СТАТУСОМ


У ЛИЦ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ВИЧ-СТАТУСОМ **ПОВЫШЕН РИСК РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА**, ПОСКОЛЬКУ ПРИ СНИЖЕНИИ ИММУНИТЕТА ОРГАНИЗМ НЕ МОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИНФЕКЦИЯМ.

ДЛЯ ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО **ОПАСЕН ДАЖЕ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ КОНТАКТ С БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.**

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ:

- ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ВЫШЕ 37°C
- СЛАБОСТЬ, БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ
- ПОВЫШЕННАЯ ПОТЛИВОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
- ПОТЕРЯ ВЕСА
- КАШЕЛЬ
- ДИАРЕЯ, БОЛЬ В ЖИВОТЕ

ВИЧ
И ТУБЕРКУЛЕЗ



ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ У СЕБЯ ЭТИ СИМПТОМЫ,
НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВРАЧУ.

**НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ
КАК МОЖНО РАНЬШЕ.**

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА И
НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ.

**НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ПЛАНОВОЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ У ИНФЕКЦИОНИСТА КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ.**